Protectia padurilor

In anul 2024 se va continua programul de monitorizare a defoliatorului Lymantria monacha, prin amplasarea a 140 capcane cu nade feromonale atraLymon in sistem monitoring (o capcana la 200 ha) .

Â Am prognozat ca in pepinierele proprii se vor realiza lucrari combate impotriva larvelor de Melolontha melolontha pe o suprafata de 8,9 ha folosindu-se insecticidul Trika Expert cu o norma de consum de 15 kg la hectar si o suprafata de 2,3 ari pentru combaterea coropisnitei folosindu-se Mospilan cu o norma de consum de 0,4 kg/ha. Impotriva fuzariozei am prognozat ca se vor combate 2,76 ha cu diferite produse cum ar fi Folpan 80WG si Previcur Energy.

O suprafata de 4,65 ha va fi stropita cu vermorelul impotriva fainarii folosindu-se Microthiol special cu o norma de consum de 1 l/ ha .

Suprafata care este prognozata a se combate in anul 2024 impotriva rozatoarelor este de 10,26 hectare folosindu-se capcane mecanice.

Suprafata plantatiilor tinere de rasinoase prognozata ca va fi afectata de daunatorul H. abietis este de 156,16 hectare .

La tratarea puietilor in anul 2024 se va folosi in continuare Mospilan . Estimativ se va utiliza o cantitate de 57 kg insecticid la tratarea celor 1140 mii puieti ce se vor planta in primavara anului 2024

Pentru protejarea plantaÅ£iilor de molid din anumite zone supuse permanent atacului trombarului puieÅ£ilor de molid (Hylobius abietis), se amplaseazÄƒ scoarÅ£e toxice, iar puieÅ£ii se Ã®mbÄƒiazÄƒ inainte de plantare Ã®n piretroizi de sintezÄƒ remanenÅ£Äƒ redicatÄƒ.Â Â Â

In arboretele de molid, Ã®n special Ã®n zonele unde s-au Ã®nregistrat rupturi sau doborÃ¢turi de vÃ¢nt (zÄƒpadÄƒ), Å£inere un nivel scÄƒzut a populaÅ£iilor de ipidae se realizeazÄƒ prin amplasarea de curse aripÄƒ (aprox. 800 buc) amorsate cu nade feromonale atraTyp ÅŸi atraChalc.

UrmÄƒrirea prezenÅ£ei ÅŸi dinamicii dÄƒunÄƒtorului Lymantria monacha se face prin amplasarea a 150 panouri cu adeziv (ur panou/200ha pÄƒdure) Ã®n sistem monitoring, amorsate cu nade feromonale atarLymon, nivelul capturilor fiind foarte slab, sub 14 fluturi/ panou.Â Â Â Starea de sÄƒnÄƒtate a arboretelor se urmÄƒreÅŸte premanent prin datele culese din pieÅ£ele de monitoring forestier